

Мифы о тополином пухе и его реальная опасность

Тематика: **Социальная сфера**
Корпоративные новости

Дата публикации: 7.06.2022

г. Москва

Дата мероприятия / события: 7.06.2022

Весна и первый месяц лета - время обострения аллергий, как и осень. Михаил Кутушов, к.м.н., врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» склонен утверждать, что пух не является возбудителем аллергии, но несёт определённую опасность для жителей больших городов.

Весна и первый месяц лета - время обострения аллергий, как и осень. Михаил Кутушов, к.м.н., врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» склонен утверждать, что пух не является возбудителем аллергии, но несёт определённую опасность для жителей больших городов.

“Тополиный пух не является аллергеном. Как и кошачья шерсть, он является только механическим раздражителем на коже. Как правило, период цветения тополей совпадает с цветением дуба, ольхи и т.д. - именно они вызывают у людей аллергию своей пылью”, - поясняет доктор Кутушов.

Основная проблема тополиного пуха - он вбирает в себя всю грязь, пыль и автомобильные газы, которые собираются в окружающей среде города. В дальнейшем, когда пух созревает, он легко собирается в клубочки разных размеров и летит по улице, попадая людям в нос и ротовую полость. К моменту столкновения с человеческим организмом в пухе собирается множество опасных микроорганизмов, ксенобиотиков и загрязнителей.

Ещё одной неприятностью большого количества тополей в городе становится тополиная моль. Она селится на деревьях после сброса пуха и размножается на них, а в дальнейшем переселяется в дома жителей города.

“Нужно усвоить, что аллергенами и возбудителями аллергий у горожан не являются тополиные деревья. Возбудитель аллергии - пыльца цветущих, а тополиный пух имеет в себе проблему негигиеничности, которая итак сегодня не уходит с повестки дня”, - настаивает доктор Кутушов.